



Carries

*de la infancia
temprana*

Area de Estomatología - Departamento Nutrición

Círculo Infantil

septiembre 2017

Caries e la infancia temprana

La caries de la infancia temprana (CIT) es la nomenclatura más reciente para un patrón particular de caries dental en niños pequeños



Afecta principalmente los dientes anteriores primarios (dientes de leche).



- Tiempo atrás se conocía como caries de biberón, pero se ha demostrado que no sólo se debe al uso frecuente del biberón con cualquier líquido azucarado sino también al pecho materno a libre demanda y a la utilización de tazas entrenadoras y chupones endulzados



La alimentación al seno materno, por sí sola, no genera Caries de la infancia temprana (CIT), pero cuando se combina con la ingesta de otros carbohidratos es capaz de producir caries





Estadío de caries AVANZADA

La CIT es una forma de caries particularmente virulenta, que comienza poco después de la erupción dental, se desarrolla en las superficies dentales lisas, progresa rápidamente y tiene un impacto perjudicial en la dentición temporal y permanente

La CIT muestra un patrón característico relacionado a dos factores:



- El primero, a la secuencia de erupción de los dientes por esto afecta principalmente a los dientes anteriores superiores
- El segundo, a la posición de la lengua durante la alimentación, la cual protege a los dientes inferiores de los líquidos durante la alimentación, por lo que generalmente estos dientes no están afectados

EL RECONOCIMIENTO DE LA CARIES

El estadio de lesión blanca

- La lesión del diente aparece como una mancha blanca con apariencia de "gis" en una superficie intacta donde la lesión de la sub-superficie es reversible



EL RECONOCIMIENTO DE LA CARIES



En niños menores de tres años, estas lesiones incipientes se observan por lo común en la superficie frontal de los dientes anteriores

Cualquier mancha blanca debe ser referida para la evaluación por un dentista.

EL RECONOCIMIENTO DE LA CARIES

El estadio de cavidad

- Si continúan perdiéndose los minerales debido a los ataques ácidos, eventualmente la superficie se rompe o se "cavita" y la lesión no puede ser revertida. si la lesión sigue progresando, grandes áreas del diente se pueden perder



EL RECONOCIMIENTO DE LA CARIES



**Las lesiones activas cavitadas son generalmente de
*color café dorado***

El **Tratamiento** para la caries de la infancia temprana consiste principalmente en medidas restauradoras **DEPENDIENDO** el estadio de la caries, cuya finalidad es promover el correcto funcionamiento y desarrollo de la dentición temporal y definitiva



Para disminuir el riesgo de desarrollar CIT, la academia americana de odontología pediátrica recomienda las siguientes medidas preventivas

- Implementar medidas de limpieza dental a antes y después de la erupción del primer diente,
- Si el niño se queda dormido mientras se está alimentando, los dientes se deben limpiar antes de acostar al niño.
- El cepillo debe ser blando, de tamaño adecuado a su edad y los padres deben realizar o asistir el cepillado





Medidas preventivas

- Se deben evitar exposiciones prolongadas de alimentos y jugos u otras bebidas que contengan carbohidratos
- La referencia temprana de los niños para evaluación dental alrededor del tiempo de la erupción dental, es quizás la medida más efectiva para la reducción de caries.

